

Feuille 4 : Séries entières

Exercice 1 : Rayon de convergence.

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions définies par les séries entières suivantes :

$$\begin{array}{llll} 1. \frac{x^n}{n!} & 2. n!x^n & 3. x^n & 4. x^n \log n \\ 5. \frac{x^n}{n^2} & 6. n^{\sqrt{n}}x^n & 7. 2^n z^{2n} & 8. \frac{9^n}{n!}x^{3n-1} \end{array}$$

et $a_n z^n$, où $a_{2n} = 2^n$, et $a_{2n+1} = 1/2^n$.

Exercice 2 : Séries entières et prolongement de fonctions

Soit $g(x) = \frac{\log(1+x)}{x}$. Quel est le domaine de définition de g ? Montrer que g se prolonge par continuité en 0. Montrer que la fonction ainsi prolongée est \mathcal{C}^∞ .

Mêmes questions avec la fonction $h(x) = \frac{\sin x}{x}$.

Exercice 3 : Somme d'une série entière

Exprimer les séries entières suivantes (dont on aura donné le rayon de convergence) à l'aide des fonctions usuelles :

$$\begin{array}{l} \text{a) } \sum_{n \geq 1} n x^{n-1}. \\ \text{b) } \sum_{n \geq 1} n^2 x^{n-1}. \\ \text{c) } \sum_{n \geq 2} \frac{x^n}{(n-1)(n+2)}. \end{array}$$

Exercice 4 : Développement en série entière

Ecrire le développement en série entière des fonctions réelles suivantes, en précisant le rayon de convergence des séries obtenues :

$$\begin{array}{l} \text{a) } \arcsin(x). \\ \text{b) } \log(1+x-2x^2), \text{ (on pourra factoriser } 1+x-2x^2\text{)}. \\ \text{c) } \int_0^x \cos(t^2) dt. \end{array}$$

Exercice 5 : Séries entières et équations différentielles

On considère l'équation différentielle suivante :

$$4xy'' + 2y' - y = 0.$$

On cherche une solution S de cette équation différentielle vérifiant en outre $S(0) = 1$, et on la cherche sous la forme d'une série entière $S(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

1. Etablir une relation de récurrence sur les (a_n) .
2. Résoudre cette relation de récurrence.
3. Sur quelle partie de \mathbb{R} la fonction S ainsi définie est solution de l'équation différentielle.
4. Exprimer S à l'aide de fonctions usuelles.

Exercice 6 : Séries entières et équations différentielles (bis)

On considère l'équation différentielle suivante :

$$xy'' - y' + 4x^3y = 0.$$

On cherche une solution S de cette équation différentielle sous la forme d'une série entière $S(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

1. Etablir une relation de récurrence sur les (a_n) .
2. En déduire que $a_{4p} = \frac{(-1)^p}{(2p)!} a_0$, $a_{4p+2} = \frac{(-1)^p}{(2p+1)!} a_2$, $a_{4p+1} = a_{4p+3} = 0$.
3. En déduire l'expression de S comme combinaison linéaire de deux séries entières simples. Exprimer ces séries entières à l'aide de fonctions usuelles.

Exercice 7 : Une fonction non développable en séries entières.

On considère $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$, définie si $x \neq 0$.

1. Etudier le prolongement par continuité de f .
2. Montrer par récurrence que si $x \neq 0$, alors :

$$f^{(n)}(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} e^{-\frac{1}{x^2}},$$

où P et Q sont des polynômes.

3. En déduire que f est dérivable à tout ordre en 0, et donner la valeur de $f^{(n)}(0)$.
4. En déduire que f n'est pas développable en série entière en 0.